

BAB 7

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasien RSK di Poliklinik Rinologi THT-KL RSUP Dr. M. Djamil padang periode Oktober 2017-September 2019 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Rinosinusitis Kronik berdasarkan usia lebih banyak ditemukan pada kelompok usia >30-50 tahun dan memiliki risiko yang sama antara laki-laki dan perempuan.
2. Gejala klinis pada penderita RSK berdasarkan kriteria *Task Force* AAOA-ARS terbanyak ditemukan dari gejala mayor adalah hidung tersumbat, sedangkan gejala minor adalah sakit kepala.
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara gejala mayor pasien RSK di RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan kriteria *Task Force* AAOA-ARS, serta tidak terdapat hubungan yang bermakna antara gejala minor pasien RSK di RSUP Dr. M. Djamil Padang dengan kriteria *Task Force* AAOA-ARS.

7.2 Saran

1. Kriteria *Task Force* AAOA-ARS, terutama pada gejala mayor diharapkan dapat digunakan sebagai faktor prediksi dalam menegakkan kasus RSK pada dokter di daerah atau pemberi pelayanan kesehatan (PPK) tingkat I, sehingga hal tersebut dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan menggunakan desain secara prospektif.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menilai faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya rinosinusitis kronis, seperti riwayat penyakit sebelumnya.